

## <予防接種後の副反応についてのご案内> (일본어)

このようなときには、このように対処しましょう。

- ・ 接種後、接種部位の腫れ・痛みがある場合、**清潔な乾いたタオルをあてた上から(氷などで)冷やす**ようにしてください。
  - ・ 接種後、微熱がある場合には、**水分を十分に摂取して安静**にしてください。
  - ・ 接種後、発熱や筋肉痛などで不快感がある場合には、**解熱・鎮痛剤を服用**すると症状が和らぎます。
- \* 予防接種の前に、あらかじめアセトアミノフェン成分の解熱・鎮痛剤を用意し、予防接種後に腕や足がずきずきと痛み、ぐったりして元気がなく悪寒がする症状がある場合は、解熱・鎮痛剤を服用してください。

。

このようなときは、医師の診療を受けてください。

- ・ 接種後、接種部位の**腫れ、痛み、赤くなる症状**が 48時間過ぎても好転しない場合
- ・ 接種後、4週間以内に**呼吸困難、胸の痛み、腹痛が続く、足のむくみなどの症状**が現れたとき
- ・ 接種後、頭痛がひどかったり2日以上続き、**鎮痛剤を服用しても効かなかったり症状が改善されない場合、または視野がかすむ場合**
- ・ 接種後、**急に気力が衰えたり普段と異なる症状**が現れた場合
- ・ 接種後、接種部位以外の場所から**あざや出血**が生じた場合

このようなときは、119番通報または救急外来を受診してください。

- ・ 接種後、**息がくるしくなったり、ひどいめまい**がした場合
- ・ 接種後、**唇や顔が腫れたり、全身にひどいじんましん**が出た場合
- ・ 接種後、**突然意識がなくなったり、倒れたり**した場合

<この翻訳はタヌリコールセンター1577-1366で担当しました。>